

REZULTATI LIJEČENJA AKUTNOG PIELONEPHRITISA IZAZVANOG E. COLI UPOREDNOM PRIMJENOM AMPICILLINA I CEFALEKSINA

Hajduković S.

JZU Dom Zdravlja « B. Vujošević », Ulcinj

UVOD: Infekcije urinarnog trakta spadaju u najčešća oboljenja dječjeg doba, odmah posle respiratornih infekcija. Urinarne infekcije se javljaju kao primarne i sekundarne,

akutne ili hronične, simptomatske ili asimptomatske. Pošto je urinarni trakt fiziološki i anatomski jedna cjelina, onda se svaka njegova infekcija označava kao pielonefritis ili još preciznije kao cistopielonefritis.

CILJ: Ovim radom želi se prikazati rezultat liječenja akutnog pielonefritisa E. Coli uporednom primjenom ampicillina i cefaleksina u dozi od 50mg. /kg. na 6 sati.

MATERIJALI I METODI RADA: Broj pacijenata je 60, podijeljen u dvije grupe po 30. uzrast pacijenata je od 7 – 10 godina. Urinokultura je rađena prije započinjanja terapije i dva dana nakon završetka terapije. Dužina trajanja terapije je 10 dana.

Rezultati rada su prikazani u tabeli I, II, III.

ZAKLJUČAK: Naše iskustvo pokazuje da u liječenju akutnog pielonefritisa izazvanog E. Coli treba dati prednost cefaleksinu u odnosu na ampicillin.