

ALERGIČNE MANIFESTACIJE KOD DECE I NIVNI TRETMAN

Timovski V., Naunova S., Timovska A.
PZO "Dr. Timovski", Štip

NAŠ MATERIJAL: Grupa 30 pacienata voзрастom od 5 do 14 godine od koih 15 muški i 15 ženski. Kod 8 pacienata imali smo manifestacije alergičnog konjuktivita, kod 10 pacienata alergičnog rinita, 7 pacienata sa kožne alergične manifestacije i 5 pacienata sa obstruktivnog napada manifestiran sa kašlicom i dispneom.

Alerčne manifestacije bili su projaveni iz različiti alergenata: polenov prah, kučna prašina, muvla i dermatofagoides. Alergenti su bili dokazani sa RIDA testom na Kliniku detskih bolesti u Skopje .

Loradatin lek je bio lek izbora u tretmanu alergičnih manifestacija, a bila je korištena i druga suportivna terapija. Efekt sprovedene terapije bio je vidljiv još prvih dva sata sa namaljenje intenziteta projavениh simptoma: svrab, rinorea, konjuktivalna reakcija, bronhospazam.

ZAKLUČOK: Terapija so Loratadin lek u vremetraewu od 3-14 dana vodi do isčezavanje alergičnih simptoma.