

UBOD OD INSEKTA I ALERGIČNE MANIFESTACIE

Timovski V., Naunova S., Timovska A.
PZO "Dr. Timovski", Štip

NAŠ MATERIJAL: Ispitanička grupa od 35 pacienata koi su posetili našu ambulantu radi uboda insekta: pčele, bolva, komarci. Mesta uboda najčesto su bili gorni ili dolni ekstremiteti Kod većina pacienata kliničke manifestacije su bile crvenilo na mesto uboda, svrab i otok koj je kod nekih pacienata bio lokaln, a kod drugih pacienata zahvatao je ceo ekstremitet. Sroveden je tretman sa antihistaminikom per os i lokalno sol. Acidi borici 3%, a radi smirenje svraba tečni puder ili Mentol spirt.

Jedan dečak od 8 godine projavijo je simptome oedema quinqae radi uboda pčele na jezik prilikom jela voča. Dečak je primio urgentnu terapiju amp. Synopen i amp. Dexamethason i uz masku sa koslorodnu bocu bio je trnsferisan na detsko odelenje. Nakon 6 časa nastupilo je lesno pobjšanje kliničke slike, a u tretman je bio uveden i bronhodilatator radi smirenje respiratorne smetnje. Nakon dva dana sakompletnu regresuju simptoma dečak je bio otpušten na domašnu negu.

ZAKLUČAK: antihistaminska terapija je lek izbor kod terapije alergične manifestacije radi uboda insekta.