

NAJČEŠĆI UZROCI BOLA U TRBUHU KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Nikolić J., Brčkalo S., Mirilović D., Lazović I.
Dom Zdravlja Čačak

UVOD: Abdominalni bol predstavlja veliki dijagnostički problem kod dece i može nastati zbog bolesti GI i LI ekstraabdominalnih oboljenja.

CILJ: Bio je praćenje frekventnosti ovog problema u radu gastroenterološke ambulante u Dečijem dispanzeru u Čačku.

MATERIJALI I METODI RADA: Retrospektivna analiza kartona u periodu od 01.01.2004 do 31.12.2004

REZULTATI: Sa ovim problemom javilo se 415-oro dece predškolskog uzrasta.

215-oro dece – 51,80% bol je imalo zbog akutnog enterokolita nebakterijske etiologije.

10-oro dece – 2,40% imalo je prisustvo pozitivne koprokulture

25-oro dece – 6,20% imalo je akutni appendicit

50-oro dece – 12,04% bol je imalo zbog urinarne infekcije i razvoja pijelonefrita.

47-oro dece – 11,30% imalo je crevnu parazitozu.

12-oro dece – 2% imalo je bol zbog ulkusne krize.

25-oro dece – 6,02% zbog opstipacije.

5-oro dece – 1,20% imalo je akutni pankreatit.

Dvoje dece – 0,48% bol je imalo u sklopu henoch-schöleim purpure.

15-oro dece – 3,60% zahtevalo je hitnu hirušku intervenciju.

9-oro dece – 2,16% imalo je prolaznu epizodu abdominalnog bola bez dijagnostikovanog uzroka.

ZAKLJUČAK: Abdominalni bol kod dece predstavlja jednu od najvećih enigmi u pedijatrijskoj ordinaciji.