

OPSTIPACIJA – ČEST RAZLOG ZA POSETU PEDIJATRU

Nikolić J., Brčkalo S., Mirilović D., Jovanović S.
Dom Zdravlja Čačak

UVOD: Pod opstipacijom se podrazumeva eliminacija male količine suve tvrde stolice i smanjena frekvencija pražnjenja creva

CILJ: Ispitati frekventnost ovog problema u radu gastroenterološke ambulante u Dečijem dispanzeru u Čačku.

MATERIJALI I METODI RADA: Retrospektivna analiza kartona dece koja su posetila ambulantu sa ovim problemom u periodu od 01.01.2005 do 30.06.2005. godine.

REZULTATI: U toku šestomesečnog praćenja u gastroenterološku ambulantu javilo se 85-oro dece sa slabije ili jače izraženim simptomima opstipacije.

50-oro dece – 58,80% opstipaciju je imalo kao prolazni poremećaj koji je korigovan primenom higijensko-dijetetskog režima.

35-oro dece – 41,20% zahtevalo je primenu terapije nakon sprovođenja odgovarajuće dijagnostičke procedure.

Od njih 35-oro kod 2 deteta dijagnostikovano je Dolichocolon-5,70%.

Kod jednog deteta dijagnostikovano je mega collon-2,80%.

Kod sedmero dece dijagnostikovano je fisura anusa-20%.

Kod 25-oro dece -71,40% radilo se o prolaznoj disfunkciji koja je korigovana primenom laksativa.

ZAKLJUČAK: Opstipacija predstavlja jedan od najčešćih problema u radu pedijatra-gastroenterologa i pristup ovom problemu mora biti multidisciplinarnan.