

PRIKAZ SLUČAJA BLIZANAČKE TRUDNOĆE KOD TRUDNICE SA SIDEROPENISKOM ANEMIJOM I Rh SENZIBILIZACIJOM

I.Milošević Manojlović¹, Lj.Milošević², V.Cokić³

¹ Služba za Transvuziju krvi ZC Zaječar

² Služba za ginekologiju i akušerstvo ZC Zaječar

³ Služba za pedijatriju ZC Zaječar

UVOD: Anemija može nastati u toku trudnoće i postpartalno iz više razloga. Ako trudnica počne trudnoću sa teškom anemijom i ispostavi se da je to blizanačka trudnoća jasno je da intrauterini razvoj ploda može biti veoma kompromitovan.

Senzibilizacija na antigene Rh sistema kod trudnice koja je Rh D(+) a nosi Rh D(-) dete je izvesna ako dođe do prelaska bebinih eritrocita u cirkulaciju majke. Svaka sledeća trudnoća može biti ugrožena stvorenim antitelima koja prolaskom kroz placentarnu barijeru dospevaju u cirkulaciju ploda i vezujući se za eritrocite izazivaju njihovu destrukciju što rezultira anemijom.

CILJ: Cilj rada je bio da prikazemo multidisciplinarno vođenje izuzetno komplikovane blizanačke trudnoće višestruko ugrožene anemijom i imunizacijom majke koja je stvorila imuna antitela, zatim da prikazemo zbrinjavanje i tretman novorođenčadi.

ZAKLJUČAK: Zaključak je da se i ovakva izuzetno komplikovana trudnoća može uspešno završiti zajedničkim radom i saradnjom lekara više specijalnosti. Deca rođena iz takvih trudnoća zahtevaju poseban tretman koji takođe podrazumeva saradnju više službi i brojne dijagnostičke i terapeutske procedure koje bi mogle biti izbegnute pravilnom prenatalnom zaštitom žena u generativnom periodu pri prekidu trudnoće ili posle porođaja.