

PASIVNO PUŠENJE I ASTMA ŠKOLSKE DECE U NIŠU

Kostić Z.¹, Marković B.¹, Đorđević M.¹, Živić G.¹, Nikolić M.²

¹ Dom zdravlja Niš

² Institut za zaštitu zdravlja Niš

UVOD: Porast učestalosti astme u dečjem uzrastu treba povezati sa porastom pušenja.Pušenja koje uvek oštećuje pušače , ali i sve u njegovoј okolini (pasivno pušenje).

CILJ: Nas cilj je da kod dece školskog uzrasta u Nišu koja boluju od astme odredimo učestalost po polu i obliku adtme,da u porodicama obolele dece utvrđimo učestalost pušenja, procenat senzibilizacije obolele dece na duvan kao i da ustanovimo njihov pojedinačan uticaj na težinu astme.

MATERIJALI I METODI RADA: Ispitanici u radu potiču iz Pulmološkog savetovališta Školskog dispanzera Doma zdravlja u Nišu. Istraživanjem su obuhvaćena ukupno 206 deteta školskog uzrasta (od 7 do 18 godina) . kod kojih je postavljena dijagnoza astme prema Jugoslovenskim smernicama za dijagnostikovanje i lečenje astme u dečjem uzrastu Beograd 2000.Deca su podeljena po polu,obliku astme (intermitentna i perzistentna) ,određen je broj dece senzibilisane na duvan i istraženo je pušenje (uopšte, jednog ili oba) roditelja u porodicama dece. Poredili smo pušenje u porodici sa oblikom astme i napravili komparaciju dece senzibilisane na duvan sa pušenjem roditelja i razlicitim oblicima astme posebno.

REZULTATI: Ispitanike je činilo 85(41,26%) devojčica i 121(58,74%) dečaka što pokazuje da je učestalost astme u školskom uzrastu u Nišu veća kod dečaka za (17,76%). Perzistentni oblik astme ima (74,76%) ispitane dece.Kod (71,84%) ima pušača u kući(samo otac,samo majka ili oba roditelja) dok je udeo porodica bez duvanskog dima (28,16%). U intermitentnom obliku astme broj porodica u kojima neko puši je veći svuda u poređenju sa perzistentnim oblikom.Senzibilizacija na duvan je nadjena u (22,33%). U (84,78%) porodica dece senzibilisane na duvan neko puši, a od njih (86,96%) ima perzistentni oblik astme.

ZAKLJUČAK:

- 1.Kod ispitane školske dece iz Niša astma je učestalija kod dečaka za 1/3 u odnosu na devojčice.
- 2.Najčešći oblik je perzistentna astma od koje boluje 3/5 ispitane dece ovog uzrasta.
- 3.Više od 2/3 ispitane dece je bilo izlozeno pasivnom pušenju i to najčešće oba roditelja.
4. Ispitana deca školskog uzrasta u Nišu senzibilisana su na duvan u (22,33%).
- 5.Postoji direktna korelacija izmedju senzibilizacije na duvan i izloženosti pasivnom pušenju.
- 6.Deca senzibilisana na duvan pokazuju teže oblike astme , posebno su osetljiviji dečaci.