

PRIMARNI I SEKUNDARNI TROMBOTIČKI POREMEĆAJI U DECE - prikaz slučaja -

Bogićević V.,Kostić G., Jovančić D.

Dečja klinika Niš

UVOD: Poremećaj ravnoteže hemostaznog sistema u smislu povišenja prokoagulantnih ili sniženja antikoagulantnih činioca dovodi do tromboze. Venske tromboze u odraslih su često oboljenje dok su u dece retka pojava, ili je takav stav posledica neuključivanja u diferencijalno-dijagnostička razmatranja ovog poremećaja kod niza oboljenja u tom uzrastu

Pojačana sklonost nastanku tromboza bez aktivacije hemostaznog sistema se definiše kao trombofilija. Kliničke manifestacije se u načelu ne razlikuju od odraslih bolesnika, a etiopatogenetski se ovi se poremećaji dele na primarne - uslovljene naslednim ili stečenim poremećajem pojedinih činioca hemostaznog sistema i sekundarne koji nastaju pod multifaktorijalnim uticajem .

REZULTATI: Prikazujemo slučaj dečaka uzrasta 13 god sa recidivantnim tromboflebitima i ulkusima podkolenica i slučaj četvorogodišnje devojčice u koje se na mestu predhodno plasirane iv kanile razvija tromboflebitis sa progresijom u flegmonu i ulkus. U oba slučaja bile su prisutne kliničke manifestacije superficijalnih tromboza a laboratorijski potvrđeno postojanje hiperkoagulabilnosti .U dečaka je otkriven urođeni poremećaj-primarna trombofilija i uvedena dugotrajna antikoagulantna terapija Warfarinom. Drugi slučaj tretiran je kao sekundaran trombotički poremećaj te je primenjena antimikrobna terapija i kratkotrajna antikoagulantna terapija niskomolekularnim Heparinom. Na primenjenu terapiju najpre laboratorijski dolazi do sniženja D-dimera (pokazatelja sek. fibrinolitičke aktivnosti) a zatim i kliničkog oporavka.