

PERINATALNA SMRTNOST U PORODILIŠTU PROKUPLJE

Bozinovic D. Mladenovic I. Bozinovic N.
*Ginekološko akusersko odeljenje, odsek neonatologije,
Opšta bolnica Prokuplje VMC Nis*

UVOD: Za pracenje perinatalnog mortaliteta od znacaja je stopa perinatalne smrtnosti. Ona predstavlja broj mrtvorodjene dece sa TM na rodjenju od najmanje 500g, plus broj umrle novorodjencadiu ranom neonatalnom periodu / 0 - 6 dana / na 1000 svih rodjenih.

U cilju smanjenja stope perinatalne smrtnosti strategija svake zdravstvene organizacije je da smanji ili anulira rizikofaktore koji su prisutni tokom trudnoce.

CILJ: Cilj naseg rada je da utvrdimo kolika je stopa perinatalnog mortaliteta i da se smanjuje kroz analizu petnaestogodisnjeg perioda / 1990 - 2004 /.

MATERIJALI I METODI RADA: Retrospektivnom analizomsu obradjeni podaci iz protokola porodjaja protokola zivorodjene dece i knjige umrle dece za period od 1990 - 2004. Analiziran je broj umrle dece po: TM, polu , redu rodjenja, gestacionoj starosti, uzroku smrti.

REZULTATI: U posmatranom petnaestogodisnjem periodu stopa perinatalne smrtnosti je od 16, 5 u 1990dosla na 7, 2 u 2004 godini. Najcesci uzroci perinatalne smrtnosti su prematuritet i kongenitalne anomalije.

ZAKLJUČAK: Permanentno pracenje svake trudnice od strane ginekologa / kroz savetovalista za trudnice, laboratorijska dijagnostika / kao i permanentno prisustvo pedijatra na odseku neonatologije u porodilistu Prokuplje dovelo se do smanjenja stope perinatalne smrtnosti